

HYACYST


Hyacyst® – enkel installasjon med prefyllt sprøyte og kateter

Hyacyst® er en steril væske som består av natriumhyaluronat som finnes naturlig i urinblærens epitel.


Hyacyst® er en effektiv behandling av interstitiell cystitt/painful bladder syndrome(IC/PBS) via kateterisering.

IC/PBS er en kronisk inflammasjon i urinblæren som forårsaker hyppig og akutt urinering samt ubehag/smerte i bekkenområdet. Den naturlige beskyttende hinne i urinblæren(epitelet) beskyttes mot skadelige emner i urinen med et proteinlager som kalles for glykosaminoglykaner (GAG). Ved IC/PBS har dette beskyttelseslaget blitt brutt ned, hvilket medfører at emnene irriterer urinblærens vegger. Dette medfører inflammasjon i urinblæren og at den lagrer urinen utilstrekkelig.

Innan behandling med Hyacyst®



Efter behandling med Hyacyst®



Til forskjell fra inflammasjon i urinblæren som forårsakes av bakterier(cystitt), hvilket assosieres med urinveisinfeksjoner (UVI) og behandles med antibiotika, har man ikke funnet noen infiserende emner hos personer som lider av IC/PBS. Selv om IC/PBS ikke kan fjernes permanent, kan det behandles og de fleste pasienter opplever en lindring av symptomene ved hjelp av behandling med hyacyst og livsstils forandringer.

Hyacyst® installasjonsløsning gir:

- Ny og høyere konsentrasjon av natriumhyaluronat
- Enkel installasjon med prefyllt sprøyte
- Effektiv regenerering av epitelet
- Raskere sårtilheling
- Ingen kjente bivirkninger
- Gode behandlingsresultater

Referanser:

Ried et al."Hyaluronan treatment of interstitial cystitis/painful bladder"
Int urogynecol J 001 10 2007 / 500192-007-0515-5



DOLEMA AB

Epost: hege.jessen@dolema.com

Telefon: 920 59 508



Ingen er like! – www.dolema.com

Tegn og symptomer på IC/PBS

Interstitiell cystitt (IC/PBS) kan forekomme på ulike måter hos de forskjellige pasientene. For eksempel opplever noen personer kroniske smerter i bekkenet, mens andre ikke merker noe. Symptomene kan intensiveres når urinblæren fylles og senere tømmes etter urinering.

Klassiske symptomer kan være følgende:

- Hyppig urinering** - urineringstilfellene kan overskride 60 ganger på 24 timer.
- Smerte** - kroniske smerter i bekkenet, vulva, urinrøret eller buksmerter ved urinering og sex.
- Akutt urinering** - følelsen av å måtte urinere akutt, ofte fulgt av smerte, trykk eller spasmer.

Terapi med Hyacyst®

Installasjon med Hyacyst® er en poliklinisk behandling og utføres av kvalifisert helsepersonell. Innen installasjon av løsningen skal blæren tømmes, deretter installeres Hyacyst® i urinblæren. Løsningen bør være i blæren minst 30 minutter eller lengere. En installasjon i uka gis under de første 4-6 ukene. Etter det gjøres behandlingen en gang per måned til symptomene forsvinner. Responstiden varierer fra pasient til pasient. Får pasienten tilbake symptomene, starter man behandlingen på nytt.

Produktinformasjon

Hyacyst® er en steril løsning med natriumhyaluronat uten farmakologisk effekt. Ved IC/PBS kan proteinlageret (GAG) brytes ned på grunn av natriumhyaluronatbrist i vevet.

- Hyacyst®:
- regenererer epitelets permeabilitet.
 - inneslutter inflammatoriske områder.
 - sørger for raskere sårtilheling

Hyacyst® gir signifikante forbedringer, også for pasienter med

- Gjentakende bakterieinfeksjoner i urinblæren.
- Strålingscystitt.
- Hemmoragisk cystitt.
- Cellegift relatert cystitt.
- Profylakse av stråling problemer.

Bestillingsinformasjon og forpakning

Art. nr.: HYC-I250 S. En prefyllt sprøyte, 50 ml 120 mg natriumhyaluronat, med vedlagt luer-lock kateter i sterile forpakninger.

Ingen kjente bivirkninger

Ingen bivirkninger kan forventes av behandlingen, bortsett fra et mulig ubehag ved å bli kateterisert

